

A Méhnyakrák Megelőzésének Európai Hete (2019. január 21-27.) ELŐZZE MEG A MÉHNYAKRÁKOT!

ISMERJE FEL A MÉHNYAKRÁK TÜNETEIT!



Fájdalmak a hát alsó részében



Fájdalmak a szexuális aktus közben



Vérzés a szexuális aktus közben/után vagy a menstruációs ciklusok között



Menopauza utáni vérzések



Anormális hüvelyfolyások

Ha ilyen tüneteket észlel, minél előbb forduljon orvoshoz

A MÉHNYAKRÁKOT A HPV VÍRUSSAL VALÓ ÁLLANDÓ FERTŐZÉS IDÉZI ELŐ

A méhnyakrákot (MNYR) a HPV vírus bizonyos törzsei idézik elő, amelyek magas kockázattal rendelkező törzsek. A HPV vírus 15 törzset osztályoztak magas kockázattal rendelkező törzsekként. Ezek közül a 16 és 18 típus felelős a méhnyakrák közel 70%-ért. A HPV vírussal való fertőzés az esetek 90%-ban magától meggyógyul. A HPV vírussal való állandó fertőzés idézi elő a rákos megbetegedéseket.

HOGYAN TERJED A HPV VÍRUSSAL VALÓ FERTŐZÉS

A HPV vírussal való fertőzés a nemi szervek leggyakoribb fertőzése. Szinte minden szexuálisan aktív személy megfertőződik ezzel legalább egyszer az élete során. A fertőzés terjedése a nemi terület bőrszövetével való érintkezése által is történhet. Az óvszer nem kínál 100%-os védelmet.

A MÉHNYAKRÁK KOCKÁZATI TÉNYEZŐI

Dohányzás, a szexuális élet korai megkezdése, a partnerek sokasága, a MNYR családi története, az immunrendszer csökkent működése, társult szexuális úton terjedő fertőzések elősegítik a HPV vírussal való fertőzést.

A MÉHNYAKRÁK MEGELŐZHETŐ

A kislányok és kamasz lányok beoltása, a szexuális élet megkezdése előtt biztonságos és 90%-os védelmet nyújt a méhnyakrákkal szemben. A felnőtt nők időszakos vizsgálata lehetővé teszi a rák előtti sérülések kiszűrését és csökkenti a méhnyakrák kockázatát. A beoltott nők szűrése – a MNYR általi különleges elhalálozási arány 30%-os csökkentéséhez járul hozzá.

A MÉHNYAKRÁK GYÓGYÍTHATÓ

Az időszakos tesztelés által kiszűrt rák előtti sérülések és az in situ daganatok gyors kezelése lehetővé teszi a méhnyakrákból való kigyógyulást és a teljes felépülést.